

## Conseils d'utilisation

- Équiper au moins 5 frelons, vérifier bien leurs trajectoires.
- Répéter l'exercice le lendemain, si possible à la même heure, pour pouvoir vérifier les trajectoires et la réussite de l'opération de la veille. Normalement, les trajectoires (donc des nids) constatées la veille auront disparu. Il est possible que vous découvriez d'autres nids qui vous auraient échappés la veille. Si vous observez une même trajectoire que la veille, ce peut être la preuve de l'existence d'un grand nid et d'un nombre insuffisant de frelons équipés rentrés dans ce nid ou de frelons mal équipés.
- Normalement, le troisième jour, à la même heure, la diminution des frelons devient plus significative et la grappe d'abeilles sur la planche de vol commence à se réduire ou disparaître devant les ruches.

### NB :

- 1 - Si vous avez bien réalisé l'opération et que, le troisième jour, vous notez l'augmentation des attaques, c'est qu'un nouveau nid a découvert votre rucher.
- 2 - Il ne faut pas s'inquiéter si un frelon équipé se pose sur un arbre avant de rejoindre son nid, il ne sera pas atteint par les effets du produit avant qu'il ne rentre dans l'espace clos de son nid et inhale le produit.
- 3 - Normalement un frelon est suffisant pour détruire un nid moyen si vous utilisez un acaricide (comme l'antipuce pour chat. L'antipuce pour chien n'est pas conseillé). Toutefois, certaines larves et couvains peuvent survivre et régénérer le nid.